

# Nyt fra bivirkningsmanager

Klinisk Farmakologisk Afdeling

## **Bivirkningsmanageren gør opmærksom på potentielt irreversibel bivirkning til metoclopramid:**

### *Længerevarende behandling med metoclopramid kan give irreversibel tardiv akatisi*

Efter måneders fast behandling med metoclopramid udviklede en midaldrende mand symptomer forenelige med tardiv akatisi. Anden somatisk årsag blev udelukket.

Akatisi er kendetegnet ved en følelse af indre uro og rastløshed. Ofte fremstår patienten motorisk urolig med repetitive bevægelser i et forsøg på at lindre den indre uro. Tilstanden kan være svært invaliderende for patienten.

Udover dopaminreceptorantagonister (særligt 1. generations antipsykotika) kan også antiemetiske lægemidler som metoclopramid forårsage tardiv akatisi. Det er en tilstand, som kan opstå sent i behandlingsforløbet og fortsætte trods behandlingsophør.

Tardiv akatisi er vanskelig at behandle, og på trods af seponering kan symptomerne persistere i årevis – i nogle tilfælde livslangt.

Metoclopramid er en almindelig årsag til ekstrapyramidale gener, inklusiv tardiv akatisi, og man bør derfor ikke overskride den anbefalede behandlingsvarighed, som er op til 5 dage.

**Se seneste statistik over bivirkninger i Region Midtjylland på side 2.**

**Bivirkningsmanagerens kontaktinfo findes på side 3.**

***Venlig hilsen,***

***Eva Sædder, ledende overlæge***

***Klinisk Farmakologisk Afdeling***

#### **Ref:**

1) The tardive syndromes: Phenomenology, concepts on pathophysiology and treatment, and other neuroleptic-induced syndromes. Stanley Fahn MD, Joseph Jankovic MD and Mark Hallett MD. Principles and Practice of Movement Disorders, Chapter 19, 415-446.

2) Waln O, Jankovic J. An update on tardive dyskinesia: From phenomenology to treatment. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2013;3


3) European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide.

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/metoclopramide-containing-medicines>

## Aktuel status på bivirkningsindberetningerne i Region Midtjylland


I perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 er der indberettet i alt 457 bivirkninger i Region Midtjylland. Heraf er 328 bivirkninger (72 %) meldt til Bivirkningsmanageren, som har stået for den videre indberetning og analyse.

**Figur 1. Det samlede antal bivirkninger indberettet pr. matrikel i perioden 1. august til 31. juli.**



Af nedenstående figur fremgår alvorsgraden af disse 328 bivirkninger.

**Figur 2. Alvorsgraden af bivirkninger indberettet via Bivirkningsmanageren (n=328).**



***Ved en formodet bivirkning kontakt os på:***

- 1) **bivirkningsmanager@auh.rm.dk**
- 2) **23 28 06 01 (hverdage 8-15)**
- 3) **Korrespondancebrev til Klinisk Farmakologisk Afd., AUH**

***Vi beder blot om følgende oplysninger:***

- 1) **Patientens CPR-nummer**
- 2) **Det mistænkte lægemiddel**
- 3) **Den formodede bivirkning**

***Tilbuddet gælder for sundhedspersonale på hospitalerne i Region Midtjylland.***